


HPV VIRUS



L'80% della popolazione è portatrice di HPV virus, seppur nella stragrande maggioranza dei casi NON si presenta alcun sintomo. Solo una percentuale molto bassa dei portatori presenta manifestazioni cliniche e in questo caso si parla di malattia da HPV.



contagio

Il contagio avviene prevalentemente per via sessuale, ma è possibile anche tramite l'utilizzo condiviso di asciugamani, biancheria o altri oggetti.



diagnosi

L'hpv viene diagnosticato clinicamente, colposcopia e dermatoscopia sono utili in questa fase. Il Pap test è poi fondamentale per stabilire se si tratta di HPV oncogeni (che provocano tumori).



terapia

Non esiste una terapia specifica, lo scopo del trattamento è curare i danni prodotti. Non c'è garanzia assoluta del risultato e si possono avere recidive, tuttavia trattare le lesioni riduce i rischi di trasmissione e di autoinoculazione.



I tempi di guarigione sono di circa 3,4 mesi e questa non esclude la presenza del virus allo stato latente. Maggiore è il numero di condilomi maggiore è il tempo necessario alla cura.



Ridurre il numero di partner riduce la possibilità di sintomi, il preservativo riduce il rischio ma non dà garanzia assoluta perché la protezione è limitata alle zone coperte.

alcune false credenze



- avere i condilomi significa avere recidive a vita
- trattare i condilomi significa azzerare la contagiosità
- solo le persone che hanno rapporti promiscui hanno l'infezione
- se la relazione è monogama infezione = tradimento
- usare i profilattici annulla il rischio
- pap test alterato = cancro
- Le donne anziane e le omosessuali non devono fare il pap test
- se il pap test è alterato il partner non deve farsi controllare



Studio polispecialistico Oristano - via Canalis 9 tel 0783 211136

www.medic-service.it

© riproduzione riservata